

# Avertissements agricoles

## AVERTISSEMENT GRANDES CULTURES

destiné aux agriculteurs du Lauragais, de la Piège et du Razès  
en rédigé en collaboration avec la ferme de Loudes et la Chambre d'Agriculture

N° 2 C DU 22/03/95

GRANDES CULTURES N° 2

**COLZA** = Méligèthes : traitez  
**POIS** = Sitones : traitez  
**BLE** = Bon état sanitaire – observez vos parcelles

### COLZA

Les **Méligèthes** sont très nombreux sur les boutons floraux; lorsque les premières fleurs sont épanouies ces ravageurs consomment le pollen libre et ne dévorent plus les boutons; beaucoup de parcelles sont encore au stade D2 (boutons accolés), vous devez les protéger

<b>DECIS CE</b>	<b>0.2</b>	<b>L/HA</b>
<b>KARATE</b>	<b>0.15</b>	<b>L</b>
<b>BAYTHROID</b>	<b>0.3</b>	<b>L</b>

Ce traitement assurera par ailleurs un contrôle sur les 1<sup>er</sup> pucerons

### POIS

Les **Sitones** sont présentes sur ces cultures; si vous constatez des morsures sur le pourtour des feuilles intervenez à l'aide de :

<b>DECIS CE</b>	<b>0.25</b>	<b>L/HA</b>
<b>KARATE</b>	<b>0.125</b>	<b>L</b>
<b>BAYTHROID</b>	<b>0.3</b>	<b>L</b>



DIRECTION RÉGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT  
SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX  
ZAC D'ALCO B.P. 3056  
34034 MONTPELLIER CEDEX 01  
Tél.: 67.10.19.50 - Fax : 67.03.10.21

PUBLICATION PÉRIODIQUE  
IMPRIMERIE DE LA STATION LANGUEDOC-ROUSSILLON  
LE DIRECTEUR M. FREYDIER - N° D'inscription 531 AD  
ABONNEMENT ANNUEL - RÉGISSEUR DE RECETTES DE LA D.R.A.F.  
C.C.P. MONTPELLIER 5238-12 G

## **BLES**

### **Bon état sanitaire dans l'ensemble**

**Septoriose** (*Septoria tritici*) : niveau d'infestation faible et risques limités

**Oïdium** : évolution stable et présence limitée aux feuilles de la base; les étages supérieurs sont dans l'ensemble sains

**Rouille brune** : assez discrète pour l'instant, mais l'inoculum est présent et l'évolution peut être rapide

Certaines parcelles sont maintenant au stade 2-3 noeuds; elles doivent être contrôlées en priorité d'autant plus si ce sont des variétés sensibles (Néodur, Brindur, Llyod, Mondur ....)

En cas de présence de pustules (au moins 3 ou 4) sur l'une des feuilles supérieures intervenez avec

<b>PAINDOR *</b>	<b>0.33 L/HA *</b>
<b>OPUS</b>	<b>1 L</b>
<b>SPOT</b>	<b>1.5 L</b>

\* en bas volume (moins de 200 l/ha) ajouter SANDOVIT à 0.5 l/ha

Si l'**oïdium** est présent de façon importante vous pouvez à l'occasion de l'intervention contre la rouille rajouter

<b>CORBEL</b>	<b>0.5 L/HA</b>
<b>CORBEL DUO</b>	<b>1 L</b>

Sauf cas particulier d'attaque importante de Rouille brune et d'oïdium sur des blés moins avancés (stade redressement-1 noeud) (se référer alors aux indications ci-dessus) aucune intervention ne se justifie pour l'instant sur les autres parcelles

Nous vous tiendrons au courant de l'évolution des maladies et des interventions à réaliser dans les prochains bulletins

**Pucerons** : souvent assez nombreux sur certaines parcelles; si vous intervenez contre les maladies foliaires vous pouvez rajouter au fongicide un insecticide :

<b>DECIS CE</b>	<b>0.3 L/HA</b>
<b>KARATE</b>	<b>0.15 L</b>
<b>BAYTHROID</b>	<b>0.3 L</b>
<b>TALSTAR</b>	<b>0.075 L</b>

### **RECOMMANDATIONS - RAPPEL**

Concernant l'utilisation des spécialités agropharmaceutiques.

Nous ne pouvons cautionner l'utilisation de fongicides à dose réduite ou en mélange avec des solutions qualifiées d'Adjuvants, qui ne sont le plus souvent que des produits destinés au rinçage des pulvérisateurs. Ces pratiques sont dangereuses, elles peuvent provoquer ou accélérer le processus d'apparition de souches résistantes, elles sont souvent inefficaces et peuvent être phytotoxiques, le gain apparent de quelques dizaines de francs peut conduire à de grands déboires. Nous ne saurions donc trop vous mettre en garde contre ces pratiques.


Nous restons à votre disposition pour vous fournir de plus amples renseignements si vous le souhaitez.



# BLÉ : MALADIES DU FEUILLAGE

## Septorioses

*Septoria tritici*




Points noirs (pycnides) visibles à l'oeil nu

*Septoria nodorum*



Taches losangiques à marge jaunâtre (chlorotique)


*Septoria nodorum*



Pycnides visibles à la loupe

## Rouilles

Rouille jaune




Pustules alignées en stries parallèles aux nervures

Rouille brune



Début d'attaque ; pustules arrondies, dispersées


Rouille brune




Pustule vue à la loupe

## Oïdium


Sur feuilles... mais aussi sur tige



Début d'attaque



Attaque ancienne



Attaque sur tige